

เพอร์แทค

Pertax RTU อารักยู่

สารป้องกันและกำจัดยุงลาย พาหะนำโรคร้าย
มาสู่ตัวท่านและครอบครัว



สูตรพร้อมใช้ได้ทันที
ออกฤทธิ์กำจัดได้เร็ว
ป้องกันได้ดี
ปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง



ปรานะคุณตายนันต์ ต้องใช้ Pertax RTU



เพอร์แทค

Pertax RTU อาร์ทียู

เพอร์แทค อาร์ทียู เป็นสารผสม ผิดขึ้นเพื่อกำจัดอย่างเฉียบพลัน
เพอร์แทค อาร์ทียู มีสารผสมของสารไพรีทรอยด์ ที่มีความปลอดภัย
ต่อผู้ที่มีความปลอดภัยต่อผิวหนังและทางปากสูงกว่าสารกำจัดแมลง

โดยทั่วไป ดังนั้น เพอร์แทค อาร์ทียู จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ตาม บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานปศุสัตว์และที่มีปัญหาเรื่องยุง
เพอร์แทค อาร์ทียู เป็นสารที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องผสม
เพอร์แทค อาร์ทียู ออกฤทธิ์กำจัดแมลงโดยการถูกตัวตาย กินตาย และขับไล่ตาย



วิธีใช้ ต้องใช้โดยผู้ที่มีความชำนาญในการกำจัดแมลง สำหรับการกำจัดยุงโดยวิธีแบบหมอกควัน
ใช้ เพอร์แทค อาร์ทียู ใช้ฉีดพ่น 4 ลิตร ต่อ 6.25 ไร่ โดยไม่ต้องผสม หรือใช้ ผสมน้ำมันดีเซล 1:1 ฉีดพ่น
อัตรา 80.1 มิลลิลิตร ต่อพื้นที่ 100 ตารางเมตร

ในห้องครัว และในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ให้ปิดหรือเคลื่อน
ย้ายอาหารภาชนะ รวมทั้งพื้นผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ห้ามฉีดพ่นขณะ
ทำการผลิต ภายหลังจากการฉีดพ่นก่อนทำการผลิตให้ทำความสะอาด
พื้นที่ผิวที่เกี่ยวข้องกับการผลิต



วิธีเก็บรักษา เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน 1.ห้ามรับประทาน 2.ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ขณะฉีดพ่นควรอยู่เหนือลมต้องระวังมิให้ เพอร์แทค อาร์ทียู เข้าตา
ปาก จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า 3.หลังจากพ่น เพอร์แทค อาร์ทียู เสร็จแล้วต้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำ
หรือ สูบบุหรี่ และซักชุดที่สวมทำงานให้สะอาด 4.ห้ามฉีดพ่นในห้องที่มีเด็กอ่อน หรือผู้ป่วย 5.ขณะทำการฉีดพ่น เพอร์แทค อาร์ทียู
ในอาคารให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดพ่นออกจากบริเวณที่ฉีดพ่น เพอร์แทค อาร์ทียู และไม่เข้าไปในบริเวณนั้นจนกว่าบริเวณที่ฉีดพ่น
จะแห้งสนิท 6.ภาชนะบรรจุ เพอร์แทค อาร์ทียู เมื่อใช้หมดแล้วต้องทำลาย ห้ามนำไปบรรจุสิ่งอื่นใด และห้ามนำไปเผาไฟจะเกิดอันตราย
7.ห้ามทิ้ง เพอร์แทค อาร์ทียู หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ หรือเครื่องพ่นลงในแม่น้ำ คู คลอง
แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.หากถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่
ทันที 2.หากสูดดม ให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ เพอร์แทค อาร์ทียู 3.หากเข้าตาให้รีบล้าง
ออกด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้ไปพบแพทย์ 4.หากกลืนกิน
เพอร์แทค อาร์ทียู ห้ามทำให้อาเจียนให้รีบนำส่งแพทย์พร้อม ภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรก
ของ เพอร์แทค อาร์ทียู

ยุงร้ายตายไม่เหลือซาก



บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด

1007/22,24 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 02-445-2053-5 โทรสาร 02-445-4705 www.sk-thai.com

ชื่อและอัตราส่วนสารสำคัญ : Permethrin 0.25% + PBO 0.50% W/V